

Bandada, Observadores de aves y vida silvestre
Boletín Nº 1

Las Aves de Santiago

Una salida de observación que mezcla lo antrópico y lo natural

-Mayo 2016-



Buscando mejorar cada día abrimos una convocatoria a finales del año pasado para que nuestros amigos nos propusieran algunos nuevos nombres para rebautizar nuestro grupo. Algunas sugerencias fueron: Trinar por Marco Guerrero, Foto Fauna por Pedro Ramirez, La Colonia por Magin Torres, entre algunos mas. Junto con ellos Martin Perl también hizo su propuesta poniendo "Bandada" sobre la mesa. Bandada nos gustó tanto que inmediatamente tomamos la decisión de adoptarlo como nuestro nuevo nombre, ya que habla de aves y grupos de ellas. Nosotros somos un grupo de amantes de la naturaleza y de las aves, nos movemos juntos para poder disfrutar de la observación de aves y de los hermosos lugares en los que se contextualiza.

Además del nombre estrenamos también un nuevo logo, diseñado por Paulina López a quien agradecemos profundamente. En él se muestra al Fío-Fío (*Elaenia albiceps*) especie arbórea y migrante austral, presente en gran parte de América del Sur.

En nuestro país es un visitante de primavera y verano, volviendo a la zona amazónica durante otoño. Es muy común en Chile, se encuentra en casi en todo el territorio, específicamente desde Atacama hasta los lugares más recónditos de Tierra del Fuego.

Escuchar los primeros Fío-fío de la temporada suele ser un gran acontecimiento, marcando la llegada de la primavera. ¿a quién no le gustaría oír a los primeros ejemplares?

De pequeño tamaño (15 cms, peso entre 12-25 gramos) pero de gran fortaleza y corazón este pequeño passeriforme viaja grandes distancias para cautivarnos con su suave trinar de libertad.



Contenido

Descripción de Salida	3
Especies destacadas de la salida	8
Fotos	12
Asistentes	24
Sociales	25
Listado de especies	28

Fotografías

Antonieta Dayne
Antonieta González
Christian Seemann
Magin Torres
Franco Villalobos

Fotografía de portada Marco Guerrero
Fotografía de contenido Antonieta González
Fotografía de contraportada Franco Villalobos

Textos

María Antonieta González
Franco Villalobos

Edición de textos

Juan José Soto

Logo Bandada

Paulina López

Diseño

Antonieta González



Para comenzar....



Magín Torres

Aunque no lo crean nuestra capital es dueña de una gran biodiversidad, en ella se describen al menos 30 especies de aves, sin contar a las aves de humedal y de ambientes cordilleranos. En los parques presentes en diferentes comunas el promedio de aves es de 18 especies, dentro de las cuales se encuentran: Zorzal (*Turdus falcklandii*), Paloma (*Columba livia*), Tórtola (*Zenaida auriculata*), Gorrión (*Passer domesticus*), Chincol (*Zonotrichia capensis*), Chercán (*Tragodytes aedon*), Tiuque (*Milvago chimango*), Tordo (*Curareus curareus*), Mirlo (*Molothrus bonariensis*), entre otros. Cuando nos vamos alejando progresivamente de la urbe comienzan a aparecer ambientes más apropiados para las aves; menos

construcciones, espacios más abiertos, presencia de matorrales y árboles se constituyen lugares idóneos para la presencia no solo de aves sino que también de otros organismos. Y precisamente eso es lo que pudimos presenciar en nuestra última salida, realizada en el sector poniente de Santiago, muy cerca de la cordillera de la costa en un lugar conocido como Rinconada de Maipú, en la comuna del mismo nombre. Este sector destaca por la presencia de cerros, cultivos y grandes planicies, además de pequeños cursos de agua y tranques.

¡Partimos!

Comenzamos nuestro recorrido en la villa Los Maitenes, precisamente en el colegio Reino de Dinamarca, en cuyo costado esta la entrada y comienzo del recorrido donde inmediatamente se comienzan a avistar aves. En la imagen adjunta se indica el punto "Mirlos", esta fue nuestra primera pequeña detención debido a la presencia de una simpática bandada de Mirlos (*Molothrus bonariensis*) revoloteando entre árboles y densos pastizales junto con algunos Chirihues (*Sicalis luteola*). En nuestros alrededores y tal como se muestra en la imagen, se presentaban campos arados con cultivos lo que nos permitió observar pequeños puntos blancos a la distancia, probablemente se trataba de Garza Boyera (*Bubulcus ibis*) ya que suele alimentarse en campos recién arados, en busca de larvas y gusanos.



Franco Villalobos

Emprendimos la caminata hacia el siguiente punto, siempre acompañados de pequeños pajaritos como Chincos (*Zonotrichia capensis*), Gorriónes (*Passer domesticus*) y Chercanes (*Tragodytes aedan*). Tal como se ve en la imagen comenzábamos a introducirnos a un ambiente de transición entre distintos grados de antropización. Donde se terminaban las casas comenzaba una planicie de gran extensión con pocos árboles, que estaban muy separados entre sí. Llamó la atención la presencia de camiones y una retroexcavadora que no fue impedimento para observar al menos dos Balarines (*Elanus leucurus*), uno de ellos, con una presa que no logramos identificar, y que fue asediado por varios Tiuques (*Milvago chimango*).

...Nos llevamos una gran sorpresa



Christian Seemann

Luego de unos minutos de caminata alcanzamos el segundo punto: el punto de los Pequeños. En él, el principal objetivo era lograr observar ejemplares de Pequeño (*Athene cunicularia*) posados en algún espino o bien observando desde algún montículo. Pasaron los minutos y no se lograba avistar ni un solo individuo, a pesar de que en visitas anteriores incluso se veían en pareja. Se decidió continuar la ruta con la esperanza de poder avistarlos cuando regresáramos durante la tarde, comenzamos a caminar y sin darnos cuenta dos individuos volaron alejándose de nosotros, ¡estaban tan bien camuflados que nunca supimos que estaban ahí! Gracias a ello no solo logramos fotografiarlos si no que también apreciar su grácil vuelo.

Tencas (*Mimus thenca*) y Diucas (*Diuca diuca*) nos despedían del territorio del Pequeño a medida que nos acercamos al punto tres. Continuando por nuestra ruta llegamos a una zona con muchos árboles pequeños ordenados en muchas hileras, las que creemos pertenecen a algún tipo de cultivo, experimento o investigación siendo realizada por la Universidad de Chile. En este lugar se tenía un antecedente de avistamiento de Halcón Perdiguero (*Falco femoralis*) por lo que teníamos las esperanzas de poder verlo de nuevo. Al cabo de unos minutos una silueta poco común se nos mostraba, inmediatamente pensamos en un Halcón Perdiguero debido a lo que sabíamos de visitas anteriores, pero para nuestra sorpresa se trataba nada más ni nada menos que de un Halcón Peregrino (*Falco peregrinus*), ave cosmopolita que tiene la capacidad de alcanzar altas velocidades y cazar en vuelo.



Antonieta González

Tiuques, tiuques y más tiuques...



Antonietta González

Muy felices por el avistamiento continuamos nuestro camino hacia el "bosque de los Tiuques" para ser casi inmediatamente sorprendidos por la presencia de otro halcón, esta vez un Perdiguero (*Falco femoralis*) delatado por su contextura, voló cerca de nosotros unos instantes para luego alejarse de nuestra vista.

Cuando llegas al bosque de los tiuques inmediatamente te das cuenta de por qué se llama así. Gran número de Tiuques pueden ser observados perchedos en las ramas de los pinos, forrajeando en el suelo, peleando en vuelo con otro individuo o simplemente descansando. Este lugar indicaba el punto de partida de un largo y recto camino que nos llevaría hasta los dos

últimos puntos del recorrido, ambos tranques de agua. Este camino en muchos tramos tiene árboles de distintos tamaños donde pudimos avistar aves como Chincol (*Zonotrichia capensis*), Cachudito (*Anairetes parulus*), Chercán (*Troglodytes aedon*), Tortolita Cuyana (*Columbina picui*), Tordo (*Curareus curareus*) y Zorzal (*Turdus facklandii*). Acercándonos cada vez más a los tranques pudimos ver ejemplares de Cernícalo (*Falco sparverius*) posados en cables y otro individuo a lo lejos posado aparentemente sobre cardos.

Lo que pudimos ver en los tranques...

Al llegar al primer tranque comenzamos a observar aves típicas de ambientes acuáticos como Tagüita (*Porphyrio melanops*), Taguas (*Fulica rufifrons*, *F. armillata*, *F. leucoptera*), Pimpollo (*Rollandia rolland*), Blanquillo (*Podiceps occipitalis*) y variedad de patos entre los que destacó el Pato Gargantillo (*Anas bahamensis*; leer más abajo) y junto con ello notamos una evidente disminución en el número de aves que en visitas anteriores habían sido registradas. En este lugar nos detuvimos a descansar y almorzar, siempre atentos a lo que podíamos observar.



Antonietta González

Al terminar este pequeño break continuamos hasta el segundo tranque donde nos sorprendería la notoria disminución del nivel del agua respecto a visitas realizadas anteriormente, si se va el agua se van las aves por lo que el número también era bastante reducido. Sin embargo nos llevamos una última sorpresa al ver al menos 10 individuos de Pitotoy Chico (*Tringa flaviceps*), especie que migra miles de kilómetros desde Norteamérica para pasar la primavera y el verano en nuestro país. Compartían el agua sin problemas con ejemplares de Queltehue (*Vanellus chilensis*) y Perrito (*Himantopus mexicanus*).

Cuando nos encontrábamos en este lugar las nubes dieron paso a un radiante sol, el cual hizo subir la temperatura unos grados, permitiendo observar algunos ejemplares de Águila (*Geranoaetus melanoleucus*) y Peuco (*Parabuteo unicinctus*).

Al finalizar la observación en el tranque regresamos al camino, nos arrimamos a la sombra de los árboles y comenzamos un recuento de las aves que habíamos visto, para posteriormente darle a conocer al grupo los nuevos nombre y logo. Cada uno de nuestros asistentes recibió un sticker de regalo.



Imagen Google earth, puntos visitados en la salida. Enviada por Magin Torres.

ESPECIES DESTACADAS DE LA SALIDA

Pato Gargantillo (*Anas bahamensis*) White-cheeked Pintail

Corresponde a una especie de pato relativamente escaso dentro de nuestro país. Se puede encontrar en otros países de sudamérica (Argentina, Perú, Ecuador, Brasil, Surinam, Guyana, Venezuela y Colombia) y el caribe (Cuba y Puerto Rico). Vive en lagunas, tranques y desembocaduras de ríos.

Por lo general se encuentran en parejas, pequeñas bandadas y en otros lugares de su distribución se han visto bandadas de hasta 1000 individuos cuando hay gran disponibilidad de alimento.

Su plumaje es pardo claro con manchas oscuras y gran mancha blanca en garganta al lado del cuello, al igual que otras especies presentes en nuestro país: el Pato Capuchino (*Anas versicolor*) y Pato Puna (*Anas puna*), sin embargo difieren en algunas características morfológicas y de distribución. El pico del pato capuchino tiene una base roja con una punta gris azulada. Su espéculo es verde con franjas canelas.

Es omnívoro y filtrador.



Fotografía Antonieta González. Pato Gargantillo acompañado de 2 taguas comunes.

Bailarín (*Elanus leucurus*) White-tailed kite

Ésta elegante ave rapaz se encuentra en hábitats abiertos donde se puede ver cerniéndose o posado en busca de su alimento, los que son pequeños mamíferos como ratones tanto nativos como introducidos y en menor porcentaje se sabe que también se alimenta de insectos y pequeñas aves.

Se puede encontrar tanto en América del norte como Sudamérica. Su distribución en Chile es desde la región de Tarapacá hasta la región de Los Lagos.

Es común verlo en zonas agrícolas, donde suele abundar su alimento.

A primera vista pareciera que fuera completamente blanco sin embargo al verlo posado podemos apreciar que sus hombros son negros, la zona alrededor de sus ojos es oscura lo que hace destacar sus ojos rojos, punta de las alas oscuras y su manto, lomo, cuello y negro poseen un color grisáceo.



Fotografía Franco Villalobos

Pequén (*Athene cunicularia*) Burrowing owl

De hábitos crepusculares, sin embargo pueden observarse teniendo actividad durante el día. A menudo se ven sobre algún poste, montículo de tierra o de pie en algún terreno abierto cerca de una madriguera, dentro de las cuales anidan. Pueden construir dicha madriguera o usar alguna que esté abandonada por algún mamífero como los conejos.

Se pueden encontrar en pastizales, tierras agrícolas, faldeos cordilleranos, estepas, aeropuertos, terrenos arenosos como dunas. Se distribuye en casi toda América con excepción de las zonas boscosas del Amazonas y Centro América.

De fácil identificación, de mayor tamaño que un Chuncho (*Glaucidium nanum*), destaca por sus largas piernas. La coloración de su dorso es café con manchas claras, mientras su abdomen y flancos de color crema con barras oscuras. Su pico y ojos son amarillos. Su característica posición erguida y sus piernas son los puntos básicos en su identificación en terreno, además de sus vocalizaciones.

Su alimentación se basa fundamentalmente en invertebrados, en menor número depreda sobre pequeños roedores, entre ellos el ratón colilarga.



Fotografía Magín Torres

Pato Rana de pico delgado (*Oxyura vittata*) Lake Duck

Pato pequeño, de cuerpo corto y con notorio dimorfismo sexual. El macho destaca por un pico azul, con cabeza y cuello negro y resto del cuerpo de color rojo oscuro, mientras la hembra y los machos juveniles poseen una coloración marrón con barras oscuras en la garganta, pecho y vientre. Además tanto la hembra como los juveniles poseen una línea blanca bajo el ojo.

Su distribución abarca Argentina y Chile, gustan de cuerpos de agua interiores, como humedales de agua dulce, pequeños lagos, tranques y pantanos.

Se encuentran en muchos cuerpos de agua interiores, prefiriendo humedales de agua dulce y pequeños lagos.

Es bueno buceando y obtiene su alimento de ésta manera.

Suele confundirse con **Pato Rana de pico grueso** (*Oxyura jamaicensis*) aun cuando se superponen en gran parte de su distribución, esta especie suele encontrarse lagunas cordilleranas. Además es de mayor tamaño y la hembra no posee la línea blanca en su cara.



Fotografía Antonieta Dayne. Ejemplar Macho.



FOTOS





Trile, macho (*Agelasticus thilius*) por Magin Torres



Pitotoy chico (*Tringa flaviceps*) por Franco Villalobos



Blanquillo, juvenil (*Podiceps occipitalis*) por Antonieta Dayne





Diuca (*Diuca diuca*) por Antonieta González



Pato jergón grande (*Anas georgica spinicauda*) por Antonieta González



Garza boyera (*Bubulcus ibis*) por Christian Seemann









ASISTENTES

Fotografía Antonieta González



Fotografía Antonieta González

Quienes nos acompañaron ésta vez fueron:

Christian Seemann

Rodrigo Guerra

Ignacio Burón

Magin Torres

Juan Luis Riquelme

Antonieta Dayne

Rodrigo Quezada

Jorge Perez

Vanessa Martinez

Paula Riquelme

Marco Guerrero

Muriel Luna

Arnaldo Riquelme

Pedro Ramirez

Cynthia Vasquez

SOCIALES



Grupo iniciando caminata a los tranques



Rodrigo Quezada



Identificando: ¿Mirlos o Tordos?



Pedro Ramirez



Magin Torres



Capturando fotografías del Pequén



Jorge Pérez y Cynthia Vasquéz



Franco Villalobos (Bandada)



Antonieta Dayne y Muriel Luna



Juan Luis Riquelme



Vanessa Martínez



Christian Seemann



Ignacio Burón y Rodrigo Guerra



Marco Guerrero



Caminata



Paula y Juan Luis Riquelme, Franco Villalobos, Antonieta Dayne



Arnaldo Riquelme



Antonieta González

Listado de Especies

Familia	Nombre Común	Nombre científico
Tyranidae	Cachudito	<i>Anairetes parulus</i>
Thraupidae	Diuca	<i>Diuca diuca</i>
Troglodytidae	Chercán	<i>Troglodytes aedon</i>
Turdidae	Zorzal	<i>Turdus falcklandii</i>
Furnariidae	Tijeral	<i>Leptasthenura aegithaloides</i>
	Canastero	<i>Pseudasthenes humicola</i>
Icteridae	Loica	<i>Sturnella loyca</i>
	Tordo	<i>Curareus curareus</i>
	Mirlo	<i>Molothrus bonaeriensis</i>
	Trile	<i>Agelasticus thilius</i>
Hirundinidae	Golondrina chilena	<i>Tachycineta meyeri</i>
Emberizidae	Chincol	<i>Zonotrichia capensis</i>
	Chirihue	<i>Sicalis luteola</i>
Anatidae	Pato gargantillo	<i>Anas bahamensis</i>
	Pato cuchara	<i>Anas platalea</i>
	Pato Jergon grande	<i>Anas georgica</i>
	Pato jergón chico	<i>Anas flavirostris</i>
	Pato rana de pico delgado	<i>Oxyura vittata</i>
Rallidae	Tagua frente roja	<i>Fulica rufifrons</i>
	Tagua chica	<i>Fulica leucoptera</i>
	Tagua común	<i>Fulica armillata</i>

	Taguita	<i>Gallinula melanops</i>
	Piden	<i>Pardirallus sanguinolentus</i>
Podicipedidae	Blanquillo	<i>Podiceps occipitales</i>
	Pimpollo	<i>Rollandia rolland</i>
Odontophoridae	Codorniz	<i>Callipepla californica</i>
Columbidae	Tórtola	<i>Zenaida auriculata</i>
	Tortolita cuyana	<i>Columbina picui</i>
	Paloma	<i>Columba livia</i>
Ardeidae	Garza chica	<i>Egretta thula</i>
	Garza grande	<i>Ardea alba</i>
	Garza boyera	<i>Bubulcus ibis</i>
Recurvirostridae	Perrito	<i>Himantopus mexicanus</i>
Laridae	Gaviota dominicana	<i>Larus dominicanus</i>
Charadriidae	Queltehue	<i>Vanellus chilensis</i>
Falconidae	Tiuque	<i>Milvago chimango</i>
	Halcón perdiguero	<i>Falco femoralis</i>
	Halcón peregrino	<i>Falco peregrinus</i>
	Cernícalo	<i>Falco sparverius</i>
Accipitridae	Bailarín	<i>Elanus leucurus</i>
	Aguila	<i>Geranoaetus melanoleucus</i>
	Peuco	<i>Parabuteo unicinctus</i>
Strigidae	Pequén	<i>Athene cunicularia</i>
Trochilidae	Picaflor chico	<i>Sephanoides sephanoides</i>
Scolopacidae	Pitotoy chico	<i>Tringa flavipes</i>
Picidae	Carpinterito	<i>Veniliornis lignarius</i>



Te dejamos invitado a participar de nuestras actividades, como también de compartir tus avistamientos, enviar fotos para colaborar con nuestra página en Facebook, [Bandadabirdwatching](#).

¡Visítanos y podrás conocer nuestras futuras actividades, información sobre nuestras aves, noticias entre otros!

Nuestro correo de contacto es bandada.informaciones@gmail.com, te responderemos a la brevedad.



